

(51)

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Int. Cl.:

C 07 d, 85/26

C 07 d, 91/16

Document FP2

Appl. No. 10/578,403

DEUTSCHES PATENTAMT



(52)

Deutsche Kl.:

12 p, 3

12 p, 4/01

(10)

(11)

(21)

(22)

(43)

Offenlegungsschrift 2 350 547

Aktenzeichen: P 23 50 547.7

Anmeldetag: 9. Oktober 1973

Offenlegungstag: 25. April 1974

Ausstellungspriorität: —

(30)

Unionspriorität

(32)

Datum:

13. Oktober 1972

2. Mai 1973

(33)

Land:

V. St. v. Amerika

(31)

Aktenzeichen:

297582

356548

(54)

Bezeichnung:

Neue substituierte Oxazolidine und Thiazolidine

(61)

Zusatz zu: —

(62)

Ausscheidung aus: —

(71)

Anmelder:

Stauffer Chemical Co., Westport, Conn. (V.St.A.)

Vertreter gem. § 16 PatG:

Beil, W., Dipl.-Chem. Dr.jur.; Hoeppener, A.;
 Wolff, H.J., Dipl.-Chem. Dr.jur.; Beil, H.Chr., Dr.jur.; Rechtsanwälte,
 6230 Frankfurt

(72)

Als Erfinder benannt:

Teach, Eugene Gordon, El Cerrito, Calif. (V.St.A.)

DT 2350547

BEST AVAILABLE COPY

© 4.74 409 817/1173

20/100

RECHTSANWÄLTE
DR. JUR. DIPL.-CHEM. WALTER BEIL
ALFRED HOEPFNER
DR. JUR. DIPL.-CHEM. H.-J. WOLFF
DR. JUR. HANS CHR. BEIL

Ka/MZ

8. Okt. 1973

623 FRANKFURT AM MAIN-HÖCHST
ADELONSTRASSE 58


2350547

Unsere Nr. 18 914

Stauffer Chemical Company
Westport, Conn., V.St.A.

Neue substituierte Oxazolidine und Thiazolidine

Die vorliegende Erfindung betrifft bestimmte neue substituierte Oxazolidine und Thiazolidine, die als Gegenmittel gegen die durch verschiedene Herbizide hervorgerufene Getreideschädigung nützlich sind. Die erfindungsgemäßen Verbindungen besitzen die allgemeine Formel



409817/1173

2350547

worin X ein Sauerstoffatom oder ein Schwefelatom, R einen Halogenalkyl-, einen Alkyl- oder einen Alkylthiorest und R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 und R_6 unabhängig voneinander ein Wasserstoffatom, einen niederen Alkylrest, einen Alkoxyalkylrest oder einen niederen Alkylolrest bedeuten, wobei, wenn X ein Sauerstoffatom, R_1 und R_2 Wasserstoffatome oder Methylreste und R_3 und R_4 , R_5 und R_6 jeweils ein Wasserstoffatom bedeuten, R keinen Dichlormethylrest bedeutet.

In der vorstehenden Beschreibung können die verschiedenen Substituenten die folgende Bedeutung besitzen:

Für R umfassen der Halogenalkyl- und der Alkyl-Rest vorzugsweise, falls nicht anders angegeben, jene Reste, die von 1 - 10 Kohlenstoffatome enthalten und sowohl gerad- als auch verzweigtkettig vorliegen, und der Ausdruck Halogen umfaßt Chlor- und Bromatome als Mono-, Di-, Tri-, Tetra- und Per-Substitutionen. Beispiele für den Alkyl-Teil innerhalb der bevorzugten Ausführungsform sind:

der Methyl-, Äthyl-, n-Propyl-, Isopropyl-, n-Butyl-, sec.-Butyl-, 1,1-Dimethylbutyl-, Amyl-, Isoamyl-, 2,4,4-Trimethylpentyl-, n-Hexyl-, Isohexyl-, n-Heptyl-, n-Octyl-, Isooctyl-, Nonyl- und Decyl-Rest. Der Ausdruck Alkylthio-Rest umfaßt vorzugsweise jene Reste, die von 1 - 4 Kohlenstoffatome enthalten, z.B. den Methylthio-, Äthylthio-, n-Propylthio-, Isopropylthio-, n-Butylthio-, t-Butylthio-Rest und dergleichen. Für die Reste R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 und R_6 umfaßt der Ausdruck niederer Alkylrest vorzugsweise, falls nicht anderweitig angegeben, jene Reste, die von 1 bis 4 Kohlenstoffatome enthalten, z.B. den Methyl-, Äthyl-, n-Propyl-, Isopropyl-, n-Butyl-, sec.-Butyl-, tert.-Butyl-Rest und dergleichen. Der Ausdruck Alkoxyalkylrest umfaßt vorzugsweise jene Reste, die insgesamt 2 bis 4 Kohlenstoffatome enthalten, z.B. Methoxymethyl-, Methoxyäthyl-, Äthoxyäthyl-, Äthoxymethyl-Rest und dergleichen. Der Ausdruck

409817/1173

niederer Alkylolrest umfaßt vorzugsweise jene Reste mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, z.B. den Methylol-, Äthylol-, Propylol- und Butylol-Rest.

Einige der erfindungsgemäßen Verbindungen sind wirksam als Herbizide und können in herbiziden Gemischen zur Bekämpfung des Wachstums unerwünschter Pflanzen verwendet werden. Die Verbindungen sind ebenfalls nützlich in Pflanzenwachstum regulierenden Gemischen, nematoziden, algiziden, bakterio-statisch wirkenden und fungiziden Gemischen.

Unter den vielen herbiziden Verbindungen, die kommerziell verfügbar sind, haben die Thiocarbamate, allein oder im Gemisch mit anderen Herbiziden, wie den Triazinen, einen relativ hohen Grad kommerziellen Erfolges erreicht. Diese Herbizide sind für eine große Zahl von Unkräutern bei verschiedenen Konzentrationen, die mit der Resistenz der Unkräuter variieren unmittelbar toxisch. Einige Beispiele dieser Verbindungen werden in den US-PSs 2 913 327, 3 037 853, 3 175 897, 3 185 720, 3 198 786 und 3 582 314 beschrieben.


In der Praxis wurde gefunden, daß die Verwendung dieser Thiocarbamate als Herbizide auf Getreide manchmal ernsthafte Schädigung der Getreidepflanzen bewirkt. Wenn diese Verbindungen in den empfohlenen Mengen in der Erde zur Bekämpfung vieler breitblättriger Unkräuter und Gräser verwendet werden, treten ernsthafte Missbildung und Verkümmern der Getreidepflanzen auf. Dieses abnormale Wachstum der Getreidepflanzen führt zu einem Verlust der Getreideaussaat. Vorangehende Versuche, dieses Problem zu überwinden, umfassten die Behandlung der Getreidesamen vor dem Pflanzen mit verschiedenen Gegenmitteln (vgl. US-PSs 3 131 509 und 3 564 768). Diese antagonistisch wirkenden Mittel waren nicht besonders erfolgreich. Die vorstehend genannte Patentschrift veran-

2350547

schaulicht die Behandlung der Samen unter Verwendung von Verbindungen einer Klasse die von der erfindungsgemäßen verschieden ist und sie nicht nahelegt.

Andere herbizide Verbindungen, deren Effekt durch die erfindungsgemäßen Verbindungen modifiziert werden kann umfassen die Acetanilide, wie z.B. 2-Chlor-2',6'-diäthyl-N-(methoxymethyl)acetanilid und die Herbizide vom Harnstofftyp, wie z.B. 3-(3,4-Dichlorphenyl)-1,1-dimethylharnstoff.

Es wurde gefunden, daß Pflanzen gegenüber Schädigung durch Herbizide vom Thiocarbamat-Typ, allein oder gemischt mit anderen Herbiziden, geschützt werden können. Eine alternative Art der Wirkung besteht darin, daß man die Toleranz der Pflanzen zu wirksamen herbiziden Verbindungen durch Zusatz einer als Gegengift wirkenden Menge einer erfindungsgemäßen Verbindung der allgemeinen Formel



worin X, R, R₁, R₂, R₃, R₄, R₅ und R₆ die vorstehend genannte Bedeutung besitzen, zu der Erde wesentlich erhöht.

Eine alternative Art der Wirkung besteht darin, daß die erfindungsgemäßen Verbindungen die normale herbizide Wirkung der Herbizide vom Thiocarbamattyp beeinträchtigen, um dieselben in ihrer Wirkung selektiv zu machen.

409817/1173

Welche Art der Wirkung auch immer wirksam ist, der entsprechende, nützliche und wünschenswerte Effekt ist der fortgesetzte herbizide Effekt des Thiocarbamates mit dem begleitenden herabgesetzten herbiziden Effekt auf die gewünschten Getreidearten. Dieser Vorteil und die Nützlichkeit werden nachfolgend näher erläutert.

Daher werden die Ausdrücke Herbizide, Gegenmittel oder als Gegenmittel wirkende Menge verwendet, um den Effekt zu beschreiben, der darauf gerichtet ist, der normalen schädigenden herbiziden Reaktion, die die Herbizide sonst erzeugen, entgegenzuwirken. Ob es als Gegenmittel, als beeinträchtigendes Mittel, als schützendes Mittel oder dergleichen bezeichnet wird, hängt ab von der exakten Art der Wirkung. Die Art der Wirkung wird variiert, aber der wünschenswerte Effekt ist das Ergebnis der Art der Behandlung des Bodens, in welchem das Getreide gepflanzt ist. Bisher gab es keine Systeme, die für diesen Zweck zufriedenstellend waren.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen der vorstehend genannten allgemeinen Formel können durch verschiedene unterschiedliche Verfahren, abhängig von den verwendeten Ausgangsmaterialien, hergestellt werden.

Die Oxazolidin und Thiazolidin-Zwischenprodukte, werden durch Kondensation eines Aminoalkohols oder -mercaptans mit einem geeigneten Aldehyd oder Keton in siedendem Benzol unter kontinuierlicher Abtrennung des Wassers hergestellt. Dieses Verfahren wird von Bergmann et al. in JACS 75, 358 (1953) beschrieben. Gewöhnlich sind die Oxazolidin- und Thiazolidin-Zwischenprodukte rein genug, um direkt ohne weitere Reinigung verwendet werden zu können. Aliquote Teile dieser Lösungen

werden dann verwendet, um die erfindungsgemäßen Verbindungen herzustellen.

Das geeignete Zwischenprodukt wird in Gegenwart eines Chlorwasserstoffakzeptors, wie Triäthylamin, zur Herstellung der gewünschten Verbindung mit einem Säurechlorid umgesetzt. Die Verfahren zum Aufarbeiten und Reinigen umfassen Standardmethoden der Extraktion, Destillation oder Kristallisation.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen und ihre Herstellung werden durch die nachfolgenden Beispiele näher erläutert. Im Anschluß an diese Beispiele ist eine Tabelle aufgeführt, in der die Verbindungen wiedergegeben werden, die gemäß den beschriebenen Verfahren hergestellt werden können. Die Verbindungen erhielten Nummern, die zu ihrer weiteren Identifikation in der Beschreibung verwendet werden.

Beispiel 1

Herstellung von 2,2-Dimethyl-3-dichloracetyl-oxazolidin

5,1 g 2,2-Dimethyl-oxazolidin, gelöst in 50 ml Benzol, wurde mit 5,5 g Triäthylamin behandelt. Unter Rühren und Kühlen in einem Eisbad wurden tropfenweise 7,4 g Dichloracetylchlorid zugesetzt. Das Gemisch wurde in Wasser gegossen, die Benzollösung wurde abgetrennt, über wasserfreiem Magnesiumsulfat getrocknet und das Lösungsmittel wurde unter Vakuum abgestrippt. Das Produkt war ein wachsartiger Feststoff, der nach Umkristallisation aus Diäthyläther einen Schmelzpunkt von 113 - 115°C aufwies.

Beispiel 2

Herstellung von 2,2,5-Trimethyl-3-dichloracetyl-oxazolidin

18 ml einer Benzollösung, die 4,6 g 2,2,5-Trimethyl-oxazolidin enthielt, wurde zu 25 ml Benzol und 4,5 g Triäthylamin zuge-

409817/1173

setzt. Unter Rühren und Kühlen in einem Eisbad wurden 5,9 g Dichloracetylchlorid tropfenweise zugesetzt. Nach Abschluß der Reaktion wurde das Gemisch in Wasser gegossen. Die Benzolschicht wurde abgetrennt und über wasserfreiem Magnesiumsulfat getrocknet und das Benzol unter Vakuum entfernt. Es wurde 7,7 g eines Öles erhalten. $n_D^{30} = 1,4950$.

Beispiel 3

Herstellung von 2,2-Dimethyl-3-dichloracetyl-thiazolidin

4,7 g 2,2-Dimethyl-thiazolidin und 4,5 g Triäthylamin wurden in 50 ml Methylenchlorid gelöst und unter Rühren tropfenweise mit 5,9 g Dichloracetylchlorid versetzt. Das Gemisch wurde in einem Wasserbad bei Raumtemperatur gekühlt.

Nach Beendigung der Reaktion wurde das Gemisch in Wasser gegossen. Die Lösungsmittelschicht wurde abgetrennt, über wasserfreiem Magnesiumsulfat getrocknet und das Lösungsmittel unter Vakuum entfernt. Es wurden 3,6 g eines wachsartigen Feststoffes erhalten. Die Umkristallisation einer anderen Probe aus Diäthyläther ergab einen weißen Feststoff mit einem Schmelzpunkt von 109 - 111°C.

Beispiel 4

Herstellung von 2,2,5,-Trimethyl-3(2',3'-dibrompropionyl)oxazolidin

25 ml Benzol und 3,5 g Triäthylamin wurden mit 14 ml einer Benzollösung, die 3,5 g 2,2,5-Trimethyloxazolidin enthielt, versetzt. 7,5 g 2,3-Dibrompropionylchlorid wurde tropfenweise unter Rühren und Kühlen in einem Eisbad zugesetzt. Nach Abschluß der Reaktion wurde das Gemisch in Wasser gegossen und die Benzolschicht abgetrennt, über wasserfreiem

Magnesiumsulfat getrocknet und das Lösungsmittel unter Vakuum abgestrippt. Es wurden 5,7 g eines Öles erhalten. $n_D^{30} = 1,5060$.

Beispiel 5

Herstellung von 2,2-Dimethyl-3-dibromacetyl-thiazolidin

Ein Gemisch aus 3,5 g 2,2-Dimethylthiazolidin, 50 ml Benzol und 7,1 g Dibromacetylchlorid, gemischt in einem Eisbad, wurde unter Rühren und weiterem Kühlen mit 3,1 g Triäthylamin tropfenweise versetzt. Nach Beendigung der Reaktion wurde das Gemisch in Wasser gegossen und die Benzolschicht abgetrennt, über Magnesiumsulfat getrocknet und das Benzol unter Vakuum entfernt. Es wurden 8,5 g eines dunklen Öles erhalten.

Beispiel 6

Herstellung von 2-Äthyl-3-S-äthylthiocarbonyl-oxazolidin

50 ml Benzol und 4,1 g Triäthylamin wurden mit 16,5 ml einer Benzollösung von 2-Äthylloxazolidin versetzt. Unter Rühren und Kühlen in einem Eisbad wurden tropfenweise 5 g Äthylchlorthiolformiat zugesetzt. Das Gemisch wurde in Wasser gegossen und die Benzollösung wurde abgetrennt, über wasserfreiem Magnesiumsulfat getrocknet und das Benzol wurde unter Vakuum abgestrippt. Es wurden 5,6 g eines Öles erhalten.
 $n_D^{30} = 1,5130$.

Beispiel 7


Herstellung von 2,2-Dimethyl-3-heptanoyl-oxazolidin

50 ml Benzol und 4,1 g Triäthylamin wurden mit 16,5 ml einer Benzollösung, die 4,6 g 2,2-Dimethyloxazolidin enthielt, versetzt. Diesem Gemisch wurde tropfenweise unter Rühren und Kühlen in einem Eisbad 6 g n-Heptanoylchlorid zugesetzt.

Das Gemisch wurde in Wasser gegossen und die Benzolschicht extrahiert, über Magnesiumsulfat getrocknet und das Benzol unter Vakuum entfernt. Es wurden 7,5 g eines Öles erhalten.
 $n_D^{30} = 1,4598$.

Die in der nachfolgend angegebenen Tabelle aufgeführten Verbindungen wurden nach den in den vorangegangenen Beispielen erläuterten Verfahren hergestellt.

Tabelle I



| Verbindung Nr. | R | R ₁ | R ₂ | R ₃ | R ₄ | R ₅ | R ₆ | X | Schmelzpunkt oder n _D ²⁰ |
|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------|---|---|
| 1 | CHCl ₂ | CH ₃ | CH ₃ | H | H | H | H | O | 116-118 |
| 2 | CH ₂ Cl | CH ₃ | CH ₃ | H | H | H | H | O | 1,4932 |
| 3 | CBBr ₃ | CH ₃ | CH ₃ | H | H | H | H | O | 1,5560 |
| 4 | CBBr ₃ | CH ₃ | CH ₃ | H | H | CH ₃ | H | O | glasartig |
| 5 | CH ₂ Cl | CH ₃ | CH ₃ | H | H | CH ₃ | H | O | 1,4842 |
| 6 | CHCl ₂ | CH ₃ | CH ₃ | H | H | CH ₃ | H | O | 1,4950 |
| 7 | CH ₂ Cl | CH ₃ | CH ₃ | C ₂ H ₅ | H | H | H | O | 1,4900 |
| 8 | CHCl ₂ | CH ₃ | CH ₃ | C ₂ H ₅ | H | H | H | O | 1,4950 |
| 9 | CCl ₃ | CH ₃ | CH ₃ | C ₂ H ₅ | H | H | H | O | 1,4970 |
| 10 | CBBr ₃ | CH ₃ | CH ₃ | C ₂ H ₅ | H | H | H | O | 1,5428 |
| 11 | CH ₃ CHBr | CH ₃ | CH ₃ | H | H | CH ₃ | H | O | 1,4995 |

409817/1173

ORIGINAL INSPECTED

| Verbindung Nr. | R | R ₁ | R ₂ | R ₃ | R ₄ | R ₅ | R ₆ | X | Schmelzpunkt oder n _D ²⁰ |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---|---|
| 12 | CH ₃ CHBr | CH ₃ | CH ₃ | C ₂ H ₅ | H | H | H | O | 1,4993 |
| 13 | CH ₂ Cl | CH ₃ | C ₂ H ₅ | H | H | H | H | O | 1,4928 |
| 14 | CHCl ₂ | CH ₃ | C ₂ H ₅ | H | H | H | H | O | 1,4982 |
| 15 | CCl ₃ | CH ₃ | C ₂ H ₅ | H | H | H | H | O | 1,5034 |
| 16 | CH ₃ CNBr | CH ₃ | C ₂ H ₅ | H | H | H | H | O | 1,5058 |
| 17 | CBr ₃ | CH ₃ | C ₂ H ₅ | H | H | H | H | O | 95-97 |
| 18 | CH ₂ Br | CH ₃ | C ₂ H ₅ | H | H | H | H | O | 1,5097 |
| 19 | CH ₂ Br | CH ₃ | CH ₃ | H | H | CH ₃ | H | O | 1,5020 |
| 20 | CH ₂ Br | CH ₃ | CH ₃ | C ₂ H ₅ | H | H | H | O | 1,5048 |
| 21 | CH ₃ (CHBr) ₄ | CH ₃ | CH ₃ | H | H | H | H | O | 1,5658 |
| 22 | CH ₂ Cl | CH ₃ | CH ₃ | CH ₃ | CH ₃ | H | H | O | 1,4843 |
| 23 | CHCl ₂ | CH ₃ | CH ₃ | CH ₃ | CH ₃ | H | H | O | 120-123 |
| 24 | CCl ₂ | CH ₃ | CH ₃ | CH ₃ | CH ₃ | H | H | O | 1,5031 |
| 25 | CH ₂ Br | CH ₃ | CH ₃ | CH ₃ | CH ₃ | H | H | O | 1,5116 |
| 26 | CH ₃ CNBr | CH ₃ | CH ₃ | CH ₃ | CH ₃ | H | H | O | 1,5140 |
| 27 | CBr ₃ | CH ₃ | CH ₃ | CH ₃ | CH ₃ | H | H | O | 1,5610 |

2350547

409817/1173

2350547

| Verbindung Nr. | R ₁ | R ₂ | R ₃ | R ₄ | R ₅ | R ₆ | X | Schmelzpunkt oder n _D ²⁰ |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---|---|
| 28 | CH ₃ | CH ₃ | H | H | H | H | O | 1,4538 |
| 29 | C ₂ H ₅ | H | H | H | H | H | S | 1,5458 |
| 30 | CH ₃ | CH ₃ | H | H | H | H | S | 109-111 |
| 31 | CH ₃ | C ₂ H ₅ | H | H | H | H | O | 1,5170 |
| 32 | CH ₃ | CH ₃ | H | H | CH ₃ | H | O | 1,5060 |
| 33 | CH ₃ | CH ₃ | C ₂ H ₅ | H | H | H | O | 1,5083 |
| 34 | CH ₃ | CH ₃ | H | H | H | H | O | 1,5178 |
| 35 | CH ₃ | t-C ₄ H ₉ | H | H | H | H | O | 1,5165 |
| 36 | CH ₃ | t-C ₄ H ₉ | H | H | H | H | O | 1,4949 |
| 37 | CH ₃ | t-C ₄ H ₉ | H | H | H | H | O | 1,5431 |
| 38 | H | H | CH ₃ | CH ₃ | H | H | O | 1,5033 |
| 39 | CH ₃ OCH ₂ | H | H | H | H | H | O | 1,5132 |
| 40 | C ₃ H ₇ | H | H | H | H | H | O | 1,4988 |
| 41 | C ₂ H ₅ | H | H | H | H | H | O | 1,5126 |
| 42 | C ₂ H ₅ | H | H | H | H | H | O | 1,5750 |
| 43 | C ₂ H ₅ | H | H | H | H | H | O | 1,5610 |
| 44 | CH ₂ Br | H | H | H | H | H | O | 1,5200 |

| Verbindung Nr. | R | R ₁ | R ₂ | R ₃ | R ₄ | R ₅ | R ₆ | X | Schmelzpunkt oder n _D ³⁰ |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------|---|---|
| 45 | CH ₃ CHBr | C ₂ H ₅ | H | H | H | H | H | O | 1,5140 |
| 46 | (CH ₃) ₂ CHBr | C ₂ H ₅ | H | H | H | H | H | O | 1,4958 |
| 47 | CH ₂ BrCHBr | C ₂ H ₅ | H | H | H | H | H | O | 1,5273 |
| 48 | CH ₂ Cl | C ₂ H ₅ | H | H | H | H | H | O | 1,5020 |
| 49 | CHCl ₂ | C ₂ H ₅ | H | H | H | CH ₃ | H | O | 1,4955 |
| 50 | CH ₂ Cl | C ₂ H ₅ | H | H | H | CH ₃ | H | O | 1,4890 |
| 51 | CH ₂ Br | C ₂ H ₅ | H | H | H | CH ₃ | H | O | 1,5064 |
| 52 | CHBr ₂ | C ₂ H ₅ | H | H | H | CH ₃ | H | O | glasartig |
| 53 | CBr ₃ | C ₂ H ₅ | H | H | H | CH ₃ | H | O | glasartig |
| 54 | CH ₃ CHBr | C ₂ H ₅ | H | H | H | CH ₃ | H | O | 1,4978 |
| 55 | CH ₂ BrCHBr | C ₂ H ₅ | H | H | H | CH ₃ | H | O | 1,5138 |
| 56 | (CH ₃) ₂ CHBr | C ₂ H ₅ | H | H | H | CH ₃ | H | O | 1,4851 |
| 57 | CHCl ₂ | H | H | C ₂ H ₅ | H | H | H | O | 1,5030 |
| 58 | CHBr ₂ | H | H | C ₂ H ₅ | H | H | H | O | dunkle Flüssigkeit |
| 59 | CBr ₃ | H | H | C ₂ H ₅ | H | H | H | O | 1,5531 |
| 60 | CH ₂ Br | H | H | C ₂ H ₅ | H | H | H | O | 1,5173 |
| 61 | CH ₃ CHBr | H | H | C ₂ H ₅ | H | H | H | O | 1,5076 |
| 62 | (CH ₃) ₂ CHBr | H | H | C ₂ H ₅ | H | H | H | O | 1,4852 |

409817/1173

2350547
- 13 -

| Verbindung Nr. | R | R ₁ | R ₂ | R ₃ | R ₄ | R ₅ | R ₆ | X | Schmelzpunkt oder n _D ³⁰ |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------|---|---|
| 63 | CH ₂ BrCHBr | H | H | C ₂ H ₅ | H | H | H | O | 1,5249 |
| 64 | CCl ₃ | H | H | C ₂ H ₅ | H | H | H | O | 1,5048 |
| 65 | CH ₂ Cl | H | H | C ₂ H ₅ | H | H | H | O | 1,4998 |
| 66 | CHCl ₂ | CH ₃ | H | H | H | H | H | O | 1,5112 |
| 67 | CCl ₃ | CH ₃ | H | H | H | H | H | O | 1,5148 |
| 68 | CH ₂ Cl | CH ₃ | H | H | H | H | H | O | 1,5077 |
| 69 | CH ₂ Br | CH ₃ | H | H | H | H | H | O | 1,5263 |
| 70 | CHBr ₂ | CH ₃ | H | H | H | H | H | O | 1,5471 |
| 71 | CBr ₃ | CH ₃ | H | H | H | H | H | O | dunkle Flüssigkeit |
| 72 | CH ₂ BrCHBr | CH ₃ | H | H | H | H | H | O | 1,5280 |
| 73 | CH ₃ CHBr | CH ₃ | H | H | H | H | H | O | 1,5162 |
| 74 | (CH ₃) ₂ CBr | CH ₃ | H | H | H | H | H | O | 1,5013 |
| 75 | CHCl ₂ | CH ₃ | H | H | H | CH ₃ | H | O | 1,4983 |
| 76 | CCl ₃ | CH ₃ | H | H | H | CH ₃ | H | O | 1,4990 |
| 77 | CH ₂ Cl | CH ₃ | H | H | H | CH ₃ | H | O | 1,4958 |
| 78 | CHBr ₂ | CH ₃ | H | H | H | CH ₃ | H | O | dunkle Flüssigkeit |
| 79 | CH ₃ CHBr | CH ₃ | H | H | H | CH ₃ | H | O | 1,5083 |
| 80 | CHBr ₂ | C ₂ H ₅ | H | H | H | H | H | S | 1,5782 |

2350547

2350547

| Verbindung Nr. | Chem. | R ₁ | R ₂ | R ₃ | R ₄ | R ₅ | R ₆ | S | Schmelzpunkt oder n _D ²⁰ |
|-------------------|--|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|---|---|
| 1781 | CH ₃ CH ₂ BrCHBr | CH ₂ H ₅ | H | H | H | CH ₃ | H | 0 | 1,5650 |
| 1782 | CH ₃ CH ₂ Br | CH ₃ | CH ₃ | H | H | CH ₃ | H | 0 | 1,5638 |
| 1783 | CH ₃ CH ₂ Br | CH ₃ | CH ₃ | H | H | CH ₃ | H | 0 | Flüssigkeit dunkle |
| 1784 | CH ₃ CH ₂ Br | CH ₃ | CH ₃ | H | H | CH ₃ | H | 0 | 1,5520 |
| 1785 | CH ₃ CH ₂ Br | CH ₃ | H | H | H | H | H | 0 | 75-77 |
| 1786 | CH ₃ CH ₂ Br | CH ₃ | H | H | H | H | H | 0 | 1,4960 |
| 1787 | CH ₃ CH ₂ Br | CH ₃ | CH ₃ | CH ₃ | CH ₂ OH | CH ₃ | H | 0 | 1,4960 |
| 1788 | CH ₃ CH ₂ Br | CH ₂ H ₅ | H | H | H | H | H | 0 | 1,5318 |
| 1789 | CH ₃ CH ₂ Br | CH ₂ H ₅ | H | H | H | CH ₃ | CH | 0 | 1,5225 |
| 1790 | CH ₃ CH ₂ Br | CH ₃ | H | H | H | CH ₃ | H | 0 | 1,5210 |
| 1791 | CH ₃ CH ₂ Br | CH ₂ H ₅ | H | C ₂ H ₅ | H | H | H | 0 | 1,4947 |
| 1792 | CH ₃ CH ₂ Br | CH ₃ | H | C ₂ H ₅ | H | H | H | 0 | 1,4998 |
| 1793 | CH ₃ CH ₂ Br | CH ₃ | H | C ₂ H ₅ | H | CH ₃ | H | 0 | 1,4965 |
| 1794 | CH ₃ CH ₂ Br | CH ₂ H ₅ | H | CH ₃ | H | CH ₃ | H | 0 | 1,4973 |
| 1795 | CH ₃ CH ₂ Br | CH ₂ H ₅ | H | C ₂ H ₅ | H | H | H | 0 | 1,4928 |
| 1796 | CH ₃ CH ₂ Br | CH ₂ H ₅ | H | C ₂ H ₅ | H | CH ₃ | H | 0 | 1,4937 |
| 1797 | CH ₃ CH ₂ Br | CH ₂ H ₅ | H | C ₂ H ₅ | H | H | H | 0 | 1,5198 |
| 1798 | CH ₃ CH ₂ Br | CH ₂ H ₅ | H | C ₂ H ₅ | H | H | H | 0 | 1,5202 |

| Verbindung Nr. | R | R ₁ | R ₂ | R ₃ | R ₄ | R ₅ | R ₆ | X | Schmelzpunkt oder n _D ²⁰ |
|-------------------|---|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---|---|
| 99 | CH ₂ BrCH ₂ | C ₂ H ₅ | H | C ₂ H ₅ | H | H | H | O | 1,4920 |
| 100 | CHCl ₂ | CH ₃ | H | C ₂ H ₅ | H | H | H | O | 1,4960 |
| 101 | C ₃ H ₇ S | CH ₃ | H | C ₂ H ₅ | H | H | H | O | 1,4900 |
| 102 | i-C ₃ H ₇ S | CH ₃ | H | C ₂ H ₅ | H | H | H | O | 1,4875 |
| 103 | CCl ₃ | CH ₃ | H | C ₂ H ₅ | H | H | H | O | 1,4990 |
| 104 | CH ₂ Br | CH ₃ | H | C ₂ H ₅ | H | H | H | O | 1,5070 |
| 105 | CH ₂ BrCHBr | CH ₃ | H | C ₂ H ₅ | H | H | H | O | 1,5168 |
| 106 | CH ₂ BrC(CH ₃)Br | CH ₃ | H | C ₂ H ₅ | H | H | H | O | 1,5160 |
| 107 | CH ₂ BrCH ₂ | CH ₃ | H | C ₂ H ₅ | H | H | H | O | 1,4950 |
| 108 | C ₄ H ₉ S | CH ₃ | H | C ₂ H ₅ | H | H | H | O | 1,4928 |
| 109 | C ₄ H ₉ S | C ₂ H ₅ | H | C ₂ H ₅ | H | H | H | O | 1,4880 |
| 110 | CH ₃ S | CH ₃ | H | C ₂ H ₅ | H | H | H | O | 1,4980 |
| 111 | C ₆ H ₁₃ | CH ₃ | CH ₃ | H | H | H | H | O | 1,4598 |
| 112 | CH ₃ S | CH ₃ | CH ₃ | C ₂ H ₅ | H | H | H | O | 1,4913 |
| 113 | n-C ₃ H ₇ S | CH ₃ | CH ₃ | C ₂ H ₅ | H | H | H | O | 1,4858 |
| 114 | i-C ₃ H ₇ S | CH ₃ | CH ₃ | C ₂ H ₅ | H | H | H | O | 1,4828 |
| 115 | CH ₂ BrCH ₂ | CH ₃ | CH ₃ | H | H | H | H | O | 1,4912 |
| 116 | CH ₂ BrCHBr | H | H | CH ₃ | CH ₃ | H | H | O | 1,5221 |

2350547

| Verbindung Nr. | R | R ₁ | R ₂ | R ₃ | R ₄ | R ₅ | R ₆ | X | Schmelzpunkt oder n _D ³⁰ |
|-------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---|---|
| 117 | CH ₂ BrCH ₂ | CH ₃ | CH ₃ | H | H | H | H | S | 1,5263 |
| 118 | CH ₂ BrCHBr | CH ₃ | CH ₃ | H | H | H | H | S | 1,5573 |
| 119 | CH ₂ BrCH ₂ | H | H | CH ₃ | CH ₃ | H | H | O | 1,4890 |
| 120 | CH ₂ Br | H | H | H | H | H | H | S | 1,6032 |
| 121 | CH ₃ CHBr | H | H | H | H | H | H | S | 1,5720 |
| 122 | CH ₂ BrCH ₂ | H | H | H | H | H | H | S | 1,5629 |
| 123 | CH ₂ BrCHBr | H | H | H | H | H | H | S | 1,5742 |
| 124 | CH ₃ C(CH ₃)Br | H | H | H | H | H | H | S | 1,5420 |
| 125 | CH ₂ ClCH ₂ | H | H | H | H | H | H | S | 1,5475 |
| 126 | BrCH ₂ (CH ₂) ₈ CH ₂ | CH ₃ | CH ₃ | H | H | H | H | O | 1,4898 |
| 127 | ClCH ₂ CH ₂ CH ₂ | CH ₃ | CH ₃ | H | H | H | H | O | 1,4880 |
| 128 | ClCH ₂ CH ₂ CH ₂ | CH ₃ | CH ₃ | H | H | H | H | S | 1,5183 |
| 129 | CH ₃ CHClCH ₂ | CH ₃ | CH ₃ | H | H | H | H | O | 1,4896 |
| 130 | CH ₃ CHClCH ₂ | CH ₃ | CH ₃ | H | H | H | H | O | 1,5115 |
| 131 | CH ₃ CHClCH ₂ | CH ₃ | CH ₃ | H | H | CH ₃ | H | O | 1,4701 |
| 132 | C ₂ H ₅ CHBr | CH ₃ | CH ₃ | H | H | H | H | O | 1,5020 |
| 133 | C ₂ H ₅ CHBr | CH ₃ | CH ₃ | H | H | H | H | S | 1,5288 |

| Verbindung Nr. | R | R ₁ | R ₂ | R ₃ | R ₄ | R ₅ | R ₆ | X | Schmelzpunkt oder n _D ³⁰ |
|-------------------|---|-----------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|---|---|
| 134 | C ₂ H ₅ CHBr | CH ₃ | CH ₃ | H | H | CH ₃ | H | O | 1,4900 |
| 135 | C ₃ H ₇ CHBr | CH ₃ | CH ₃ | H | H | H | H | O | 1,4972 |
| 136 | C ₃ H ₇ CHBr | CH ₃ | CH ₃ | H | H | H | H | S | 1,5220 |
| 137 | C ₃ H ₇ CHBr | CH ₃ | CH ₃ | H | H | CH ₃ | H | O | 1,4870 |
| 138 | CH ₂ ClCH ₂ CH ₂ | CH ₃ | CH ₃ | H | H | CH ₃ | H | O | 1,4747 |
| 139 | CH ₂ Br(CH ₂) ₄ | CH ₃ | CH ₃ | H | H | H | H | O | 1,4970 |
| 140 | CH ₂ Br(CH ₂) ₄ | CH ₃ | CH ₃ | H | H | CH ₃ | H | O | 1,4886 |
| 141 | CH ₂ Br(CH ₂) ₄ | CH ₃ | CH ₃ | H | H | H | H | S | 1,5249 |
| 142 | CH ₂ BrCBr(CH ₃) | H | H | H | H | H | H | S | halbfest |
| 143 | CH ₂ Cl | H | H | H | H | H | H | S | 1,5540 |
| 144 | CHCl ₂ | CH ₃ | C ₂ H ₅ | H | H | H | H | S | 1,5443 |
| 145 | CH ₃ CHBr | CH ₃ | C ₂ H ₅ | H | H | H | H | S | 1,4327 |
| 146 | CH ₂ BrCH ₂ | CH ₃ | C ₂ H ₅ | H | H | H | H | S | 1,4293 |
| 147 | CH ₂ Cl | CH ₃ | C ₂ H ₅ | H | H | H | H | S | 1,5279 |

2350547

- 18 -

Es ist verständlich, daß die Klassen der hierin beschriebenen und erläuterten herbiziden Mittel als wirksame Herbizide, die solche Aktivität zeigen, charakterisiert sind. Der Grad der herbiziden Wirksamkeit variiert unter den spezifischen Verbindungen und Kombinationen der spezifischen Verbindungen innerhalb der Klassen. Ähnlich variiert der Grad der Wirksamkeit einigermaßen unter den Pflanzenarten, auf die eine spezifische herbizide Verbindung oder Kombination angewendet werden kann. Daher kann die Auswahl einer spezifischen herbiziden Verbindung oder Kombination zur Bekämpfung unerwünschter Pflanzenarten leicht vorgenommen werden. Innerhalb der vorliegenden Erfindung kann die Verhinderung der Schädigung einer gewünschten Getreideart in Gegenwart einer spezifischen Verbindung oder Kombination erreicht werden. Die nützlichen Pflanzenarten, die durch diese Methode geschützt werden können, sind nicht auf die spezifischen Getreidearten, die in den Beispielen genannt sind, beschränkt.

Die herbiziden Verbindungen, die bei der Anwendung der vorliegenden Erfindung verwendet werden können, sind wirksame Herbizide eines allgemeinen Typs. Das heißt, die Glieder der Klassen sind herbizid wirksam gegenüber einem breiten Bereich von Pflanzenarten ohne Unterschied zwischen den gewünschten und unerwünschten Spezies. Das Verfahren zur Bekämpfung der Vegetation umfasst die Anwendung einer herbiziden wirksamen Menge der hierin beschriebenen herbiziden Verbindungen auf ein Gebiet oder Ort, wo die Bekämpfung gewünscht ist. Ein Herbizid, wie es hierin verwendet wird, bedeutet eine Verbindung, welche das Wachstum der Vegetation oder Pflanzen bekämpft oder modifiziert. Solche Bekämpfungs- oder Modifizierungseffekte umfassen alle Abweichungen von der natürlichen Entwicklung, z.B. das Abtöten, das Verzögern, den Blätterfall, das Austrocknen, die Regulierung, das Verkümmern, die Bestockung, die Stimulation, das Schrumpfen

und dergleichen. Unter dem Ausdruck "Pflanzen" werden keimende Samen, aufgehende Sämlinge und aufgegangene Pflanzen (established vegetation), einschließlich der Wurzeln und der oberirdischen Teile, verstanden.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen werden in wirksamen herbiziden, Gegenmittel enthaltenden Gemischen, die Thiocarbamate in Kombination mit den vorstehend beschriebenen, als Gegenmittel wirkenden Verbindungen enthalten, angewandt. Sie wurden in der folgenden Art und Weise getestet.

Tests zur Behandlung von Getreidesamen

Kleine flache Kästen wurden mit Feltons lhmiger Sanderde gefüllt. Zu dieser Zeit wurde mit Herbiziden behandelte Erde angewandt. Die Erde aus jedem Kasten wurde in einen 18,9 l fassenden Zementmischer gebracht, wo die Erde, wenn die Herbizide unter Verwendung einer vorbestimmten Menge einer Vorratslösung, die 936 mg von 75,5%igem Wirkstoff auf 100 ml Wasser enthielt, angewandt wurden, gemischt wurde. Für jeweils 0,454 kg des gewünschten Herbizides wurde mit einer Volumetrischen Pipette 1 ml der Vorratslösung auf die Erde aufgebracht. 1 ml der Vorratslösung enthielt 7 mg des Herbizides, welches $0,112 \text{ g/m}^2$ entsprach, wenn es auf die Erde in den Kästen aufgebracht wurde. Nach der Einarbeitung des Herbizides wurde die Erde erneut in die Kästen gebracht.

Die Kästen, die die mit Herbizid behandelte und unbehandelte Erde enthielten, waren dann fertig zum Bepflanzen. Eine 0,47 l Probe der Erde wurde aus jedem Kasten entfernt und in der Nähe jedes Kasten zur späteren Verwendung zur Abdeckung der Samen angeordnet. Die Erde wurde geebnet und Reihen einer Tiefe von 1,27 cm wurden zum Pflanzen der Samen angelegt. Alternierende Reihen von behandelten und unbehandelte

Getreidesamen wurden gesät. In jedem Test wurden in jeder Reihe 6 PAG 344T Feld-Kornsamen gepflanzt. In dem Kasten waren die Reihen etwa 3,81 cm auseinander. Die Samen wurden behandelt, indem man 1. entweder 50 mg der als Gegenmittel wirkenden Verbindung mit 10 g Kornsamen in einem geeigneten Behälter brachte und schüttelte bis die Samen gleichmäßig mit der Verbindung bedeckt waren oder 2. durch Auflösen von 50 mg der als Gegenmittel wirkenden Verbindung in 5 ml Aceton eine Vorratslösung herstellte und anschließend 0,5 ml dieser Lösung zur Behandlung von 10 g Kornsamen (0,05% Gewicht/Gewicht) verwendete. Die als Gegenmittel verwendeten Verbindungen wurden ebenfalls als flüssige Aufschlämmungen und Pulver oder in zerstäubter Form angewandt. In einigen Fällen wurde Aceton angewandt, um die pulverförmigen oder festen Verbindungen zu lösen, damit sie wirksamer auf die Samen aufgebracht werden konnten.

Nachdem die Kästen mit Samen versehen waren, wurden sie mit 0,47 l der Erde, die vor dem Pflanzen entfernt worden war, bedeckt. Die Kästen wurden auf in einem Gewächshaus befindlichen Bänken abgestellt, wo Temperaturen im Bereich von 21,1 - 32,2°C herrschten. Die Kästen wurden mit einem Sprinkler bewässert, was zur Gewährleistung eines guten Pflanzenwachstums notwendig war. Zwei, drei und vier Wochen nach der Behandlung wurde der prozentuale Grad der Bekämpfung bestimmt.

In jedem Test, wurde das Herbizid allein, in Kombination mit dem Samenschutzmittel und das Samenschutzmittel allein zur Prüfung auf Phytotoxizität angewandt. Die unbehandelte benachbarte Reihe wurde angewandt, um jede nützliche laterale Bewegung der als Gegenmittel wirkenden Verbindung in die Erde zu beobachten. Der Grad des Effektes wurde durch Vergleich mit der Kontrollprobe notiert. Die Ergebnisse dieser Tests sind in Tabelle II zusammengestellt.

Tabelle II

% Schädigung von Korn durch EPTC⁺
Samenbehandlungstest

| Verbindung Nr. | <u>% Schädigung, 2 Wochen</u> | |
|-------------------|--|---|
| | behandelte Samen (0,05% Gew./Gew.) | unbehandelte Samen, angren- zende Reihe |
| 1 ⁺⁺ | 5 | 30 |
| 2 | 70 | 80 |
| 3 ⁺⁺ | 40 | 60 |
| 4 | 10 | 50 |
| 5 | 30 | 60 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 40 | 55 |
| 8 | 0 | 15 |
| 9 | 10 | 55 |
| 10 | 20 | 60 |
| 11 | 30 | 50 |
| 12 | 10 | 40 |
| 13 | 50 | 70 |
| 14 | 0 | 20 |
| 15 | 20 | 50 |
| 16 | 10 | 55 |
| 17 | 30 | 50 |
| 18 | 20 | 50 |
| 19 | 40 | 50 |
| 20 | 20 | 60 |
| 21 | 50 | 50 |
| 22 | 60 | 60 |
| 23 | 50 | 60 |
| 24 | 20 | 60 |
| 25 | 20 | 70 |

409817/1173

Tabelle II (Fortsetzung)

% Schädigung von Korn durch EPTC⁺

Samenbehandlungstest

| Verbindung Nr. | % Schädigung, 2 Wochen | |
|--------------------------------|--|---|
| | behandelte Samen (0,05% Gew./Gew.) | unbehandelte Samen, angren- zende Reihe |
| 26 | 20 | 60 |
| 27 | 20 | 60 |
| 28 | 60 | 70 |
| 29 | 0 | 5 |
| 30 | 20 | 5 |
| <hr/> | | |
| EPTC 6E unbehandelter Samen | -- | 70 80 (4 Wochen) |

+ = S-Äthyl-dipropylthiocarbamat 6E: 0,672 g/m² vor
dem Pflanzen eingearbeitet.

++ = Samenbehandlung 0,01% (Gew./Gew.)

Unter Verwendung von 2-Chlor-2',6'-diäthyl-N-(methoxymethyl)-
acetanilid bei 0,224 g/m² als Samenbehandlungsmittel (0,5%)
ergab die Verbindung Nr. 144 einen 100%igen Schutz für
Sorghum (Milo).

Verfahren: Mehrere Getreide umfassender Gegenmittel-Test
(Multicrop Antidote Screen)

Plastikkästen wurden mit Feltons lehmiger Sanderde gefüllt.
Da eine Vielzahl von Gras und breitblättrigem Getreide in
diesem Test verwendet wurde, wurde EPTAM^R (EPTC) in Men-

gen von $0,056 \text{ g/m}^2$ und $0,560 \text{ g/m}^2$ eingearbeitet, während eine konstante Menge von $0,560 \text{ g/m}^2$ des Zusatzes verwendet wurde. EPTAM (EPTC) und der herbizide Zusatz wurden getrennt aufgebracht, indem man abgemessene Mengen der entsprechenden Vorratslösungen während der Einarbeitung in einem 18,9 l fassenden rotierenden Zementmischer unter Verwendung einer Pipette in die Erde gebracht wurden. Vorratslösungen für EPTAM wurden folgendermaßen hergestellt:

- A. $0,056 \text{ g/m}^2$: 670 mg EPTC 6E (75,5% Wirkstoff) wurden mit 500 ml entionisiertem Wasser verdünnt, so daß $2 \text{ ml} = 0,056 \text{ g/m}^2$ /Plastikkasten entsprachen..
- B. $0,560 \text{ g/m}^2$: 6700 mg von EPTC 6E (75,5% Wirkstoff) wurden mit 500 ml entionisiertem Wasser verdünnt, so daß $2 \text{ ml} = 0,560 \text{ g/m}^2$ /Plastikkasten entsprachen.

Weitere Vorratslösungen wurden hergestellt, indem man 102 mg von technischem Material mit 10 ml Aceton mit einem Gehalt von 1% Polyoxyäthylen-sorbitan-monolaurat (Tween 20) verdünnte, so daß $2 \text{ ml} = 0,560 \text{ g/m}^2$ /Kasten entsprachen. Nach Behandlung des Bodens mit dem Herbizid und dem Zusatz wurde der Boden aus dem Mischer in den Kasten zurückgebracht, wo er zum Säen vorbereitet wurde. Die erste Stufe der Vorbereitung bestand darin, daß man eine Probe von 0,47 l der Erde aus jedem Kasten entfernte, um sie aufzubewahren und zum Bedecken der Samen nach dem Pflanzen zu verwenden. Die Erde wurde dann eingeebnet und Reihen einer Tiefe von 0,63 cm wurden in jedem Kasten hergestellt. Mit $0,560 \text{ g/m}^2$ EPTAM behandelte Kästen wurden mit Zea maize, Beta vulgaris, Helianthus annuus, Gossypium hirsutum, Glycine max. und Brassica napus besät. In Kästen, die mit $0,056 \text{ g/m}^2$ EPTAM behandelt wurden, wurden Avena byzantina, Sorghum vulgare, Triticum aestivum, Seteria feberii, Oryza sativa und Hordeum vulgare gesät. Die Samen wurden anschließend mit

der 0,47 l Probe, die vor dem Säen entfernt worden war, bedeckt.

Die Kästen wurden anschließend auf Bänke in einem Gewächshaus gebracht, wo Temperaturen zwischen 21,1 - 32,2°C aufrecht erhalten wurden. Die Erde wurde mit Sprinklern bewässert, um ein gutes Pflanzenwachstum zu gewährleisten.

2 und 4 Wochen nach der Behandlung wurde der Grad der Beschädigung bestimmt. Erde, die mit EPTAM allein in Mengen von 0,056 oder 0,560 g/m² behandelt war, wurde ebenfalls untersucht, um eine Basis zur Bestimmung der Menge der Schädigungsverminderung bereitzustellen, die durch die Herbizid-Gegenmittel erreicht wurde. Der prozentuale Schutz von zahlreichen repräsentativen Getreiden wird in Tabelle III zusammengestellt. Der prozentuale Schutz wird bestimmt durch einen Vergleich mit Kästen, die nicht mit dem zu untersuchenden Gegenmittel behandelt worden waren.

Tabelle III

Mehrere Getreide umfassende
Test- Ergebnisse, %-Schutz

| Verbindung Nr. | Menge von EPTC, g/m ² | Getreide | %-Schutz (2 Wochen) |
|-------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------|
| 31 | 0,056 | Gerste | 56 |
| | | Reis | 30 |
| 32 | 0,056 | Gerste | 56 |
| | | Reis | 30 |
| | | Korn (corn) | 100 |
| 33 | 0,056 | Reis | 30 |
| | | Gerste | 44 |
| 34 | 0,056 | Gerste | 88 |
| | 0,560 | Korn | 100 |

409817/1173

Tabelle III (Fortsetzung)

Mehrere Getreide umfassende
Test- Ergebnisse, %-Schutz

| Verbindung Nr. | Menge von EPTC, g/m ² | Getreide | %-Schutz (2 Wochen) |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 35 | 0,056 | Gerste | 44 |
| | 0,560 | Korn | 100 |
| 36 | 0,560 | Korn | 100 |
| 37 | 0,560 | Korn | 100 |
| 38 | 0,056 | Gerste | 88 |
| | 0,560 | Korn | 100 |
| | 0,560 | Sonnenblume | 50 |
| 39 | 0,560 | Korn | 100 |
| | 0,560 | Sonnenblume | 25 |
| | 0,560 | Raps | 60 |
| 40 | 0,560 | Korn | 100 |
| | 0,560 | Sonnenblume | 25 |
| 41 | 0,056 | Gerste | 50 |
| | 0,560 | Korn | 100 (4 Wochen) |
| 42 | 0,560 | Korn | 56 (4 Wochen) |
| 43 | 0,560 | Korn | 93 (4 Wochen) |
| 44 | 0,560 | Korn | 28 (4 Wochen) |
| 45 | 0,056 | Gerste | 50 |
| | 0,560 | Sonnenblume | 81 |
| 46 | 0,056 | Reis | 100 (4 Wochen) |
| 47 | 0,056 | Reis | 100 (4 Wochen) |
| | 0,056 | Gerste | 75 (4 Wochen) |
| | 0,560 | Raps (oilseed rape) | 68 (4 Wochen) |
| 48 | 0,056 | Gerste | 25 |
| | 0,560 | Sonnenblume | 67 (4 Wochen) |
| 49 | 0,056 | Sorghum | 50 |
| | 0,056 | Gerste | 50 |
| | 0,560 | Korn | 100 (4 Wochen) |

409817/1173

Tabelle III (Fortsetzung)

Mehrere Getreide umfassende
Test- Ergebnisse, %-Schutz

| Verbindung Nr. | Menge von EPTC, g/m ² | Getreide | %-Schutz (2 Wochen) |
|-------------------|-------------------------------------|----------|------------------------|
| 50 | 0,560 | Korn | 100 (4 Wochen) |
| 51 | 0,560 | Korn | 42 (4 Wochen) |
| 52 | 0,560 | Korn | 100 (4 Wochen) |
| 53 | 0,056 | Reis | 100 (4 Wochen) |
| | 0,056 | Gerste | 50 (4 Wochen) |
| | 0,560 | Korn | 70 (4 Wochen) |
| 54 | 0,056 | Gerste | 50 |
| | 0,560 | Korn | 100 (4 Wochen) |
| 55 | 0,056 | Weizen | 20 (4 Wochen) |
| | 0,056 | Gerste | 100 (4 Wochen) |
| | 0,560 | Korn | 93 (4 Wochen) |
| 56 | 0,056 | Sorghum | 10 (4 Wochen) |
| 57 | 0,056 | Gerste | 50 |
| | 0,560 | Korn | 100 (4 Wochen) |
| 58 | 0,056 | Reis | 100 (4 Wochen) |
| 59 | 0,560 | Korn | 93 (4 Wochen) |
| 60 | 0,056 | Reis | 100 (4 Wochen) |
| | 0,560 | Korn | 42 (4 Wochen) |
| 61 | 0,056 | Sorghum | 40 (4 Wochen) |
| | 0,056 | Gerste | 75 (4 Wochen) |
| | 0,560 | Reis | 70 (4 Wochen) |
| 62 | 0,560 | Raps | 65 (4 Wochen) |
| 63 | 0,056 | Gerste | 75 |
| 64 | 0,560 | Korn | 42 (4 Wochen) |
| 65 | 0,560 | Korn | 70 (4 Wochen) |
| 66 | 0,560 | Korn | 100 (4 Wochen) |
| 67 | 0,560 | Korn | 28 (4 Wochen) |
| 68 | 0,056 | Reis | 100 (4 Wochen) |
| | 0,560 | Korn | 93 (4 Wochen) |

409817/1173

Tabelle III (Fortsetzung)

Mehrere Getreide umfassende
Test- Ergebnisse, %-Schutz

| <u>Verbindung Nr.</u> | <u>Menge von EPTC, g/m²</u> | <u>Getreide</u> | <u>%-Schutz (2 Wochen)</u> |
|---------------------------|--|-----------------|--------------------------------|
| 69 | 0,560 | Korn | 42 (4 Wochen) |
| 70 | 0,560 | Korn | 100 (4 Wochen) |
| 71 | 0,560 | Korn | 70 (4 Wochen) |
| 72 | 0,056 | Reis | 100 (4 Wochen) |
| | 0,056 | Gerste | 50 (4 Wochen) |
| | 0,560 | Korn | 100 (4 Wochen) |
| 73 | 0,560 | Korn | 100 (4 Wochen) |
| 74 | 0,560 | Korn | 42 (4 Wochen) |
| 75 | 0,056 | Sorghum | 71 |
| | 0,056 | Weizen | 60 |
| | 0,560 | Korn | 87 |
| | 0,560 | Raps | 71 |
| 76 | 0,560 | Korn | 56 (4 Wochen) |
| 77 | 0,560 | Korn | 100 (4 Wochen) |
| | 0,560 | Zuckerrüben | 28 (4 Wochen) |
| 78 | 0,056 | Reis | 100 (4 Wochen) |
| | 0,560 | Korn | 100 (4 Wochen) |
| | 0,560 | Sonnenblume | 81 (4 Wochen) |
| 79 | 0,056 | Gerste | 50 |
| | 0,560 | Korn | 100 (4 Wochen) |
| | 0,560 | Sonnenblume | 67 (4 Wochen) |
| 80 | 0,560 | Korn | 70 (4 Wochen) |
| | 0,560 | Raps | 56 (4 Wochen) |
| 81 | 0,056 | Gerste | 50 (4 Wochen) |
| | 0,560 | Sonnenblume | 67 (4 Wochen) |
| 82 | 0,560 | Korn | 56 (4 Wochen) |
| 83 | 0,056 | Reis | 100 (4 Wochen) |

Tabelle. III (Fortsetzung)

Mehrere Getreide umfassende
Test- Ergebnisse, %-Schutz

| Verbindung Nr. | Menge von EPTC, g/m ² | Getreide | %-Schutz (2 Wochen) |
|-------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------|
| 84 | 0,056 | Reis | 100 (4 Wochen) |
| | 0,056 | Gerste | 50 (4 Wochen) |
| 85 | 0,056 | Reis | 100 (4 Wochen) |
| | 0,056 | Gerste | 75 (4 Wochen) |
| | 0,560 | Korn | 93 (4 Wochen) |
| 86 | 0,056 | Gerste | 50 (4 Wochen) |
| | 0,560 | Korn | 100 (4 Wochen) |
| 87 | 0,560 | Korn | 93 (4 Wochen) |
| 88 | 0,056 | Gerste | 45 |
| 89 | 0,056 | Weizen | 67 |
| | 0,560 | Raps | 75 |
| 90 | 0,056 | Weizen | 15 |
| 91 | 0,056 | Sorghum | 50 |
| | 0,560 | Korn | 84 |
| 92 | 0,560 | Raps | 75 |
| 93 | 0,560 | Raps | 75 |
| 94 | 0,560 | Raps | 75 |
| 95 | 0,560 | Raps | 75 |
| 96 | 0,560 | Korn | 80 |
| 97 | 0,056 | Gerste | 50 |
| 98 | 0,560 | Sonnenblume | 60 |
| 99 | 0,056 | Gerste | 88 |
| 100 | 0,560 | Korn | 100 |
| 101 | 0,560 | Sonnenblume | 100 |
| 102 | 0,560 | Raps | 50 |
| 103 | 0,056 | Sorghum | 30 (4 Wochen) |
| | 0,560 | Korn | 100 |

Tabelle III (Fortsetzung)Mehrere Getreide umfassende
Test- Ergebnisse, %-Schutz

| Verbindung Nr. | Menge von EPTC, g/m ² | Getreide | %-Schutz (2 Wochen) |
|-------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------|
| 104 | 0,056 | Reis | 30 (4 Wochen) |
| | 0,056 | Sorghum | 30 (4 Wochen) |
| 105 | 0,056 | Weizen | 30 (4 Wochen) |
| | 0,056 | Gerste | 75 (4 Wochen) |
| 106 | 0,560 | Sonnenblume | 20 (4 Wochen) |
| 107 | 0,056 | Weizen | 40 (4 Wochen) |
| | 0,056 | Gerste | 60 (4 Wochen) |
| | 0,560 | Korn | 100 (4 Wochen) |
| 108 | 0,560 | Raps | 75 |
| 109 | 0,560 | Raps | 75 |
| 110 | 0,560 | Raps | 75 |
| 111 | 0,560 | Sonnenblume | 60 |
| 112 | 0,560 | Raps | 75 |
| 113 | 0,560 | Raps | 67 |
| 114 | 0,560 | Raps | 33 |
| 115 | 0,056 | Gerste | 70 (4 Wochen) |
| | 0,560 | Korn | 10 (4 Wochen) |
| 116 | 0,056 | Gerste | 58 (4 Wochen) |
| | 0,560 | Sonnenblume | 60 (4 Wochen) |
| | 0,560 | Korn | 100 (4 Wochen) |
| 117 | 0,056 | Gerste | 58 (4 Wochen) |
| | 0,560 | Korn | 100 (4 Wochen) |
| 118 | 0,056 | Gerste | 58 (4 Wochen) |
| | 0,560 | Korn | 65 (4 Wochen) |
| 119 | 0,056 | Gerste | 68 (4 Wochen) |
| | 0,560 | Korn | 100 (4 Wochen) |
| 120 | 0,560 | Sonnenblume | 30 |
| 121 | 0,056 | Reis | 67 (4 Wochen) |
| | 0,560 | Raps | 60 (4 Wochen) |

Tabelle III (Fortsetzung)

Mehrere Getreide umfassende
Test- Ergebnisse, %-Schutz

| <u>Verbindung Nr.</u> | <u>Menge von EPTC, g/m²</u> | <u>Getreide</u> | <u>%-Schutz (2 Wochen)</u> |
|---------------------------|--|-----------------|--------------------------------|
| 122 | 0,056 | Gerste | 58 (4 Wochen) |
| | 0,560 | Korn | 100 (4 Wochen) |
| 123 | 0,056 | Reis | 44 (4 Wochen) |
| 124 | 0,056 | Reis | 67 (4 Wochen) |
| | 0,056 | Gerste | 58 (4 Wochen) |
| 125 | 0,056 | Reis | 88 (4 Wochen) |
| 126 | 0,056 | Reis | 100 |
| | 0,056 | Gerste | 100 |
| 127 | 0,056 | Reis | 78 |
| | 0,056 | Gerste | 64 |
| 128 | 0,056 | Reis | 78 |
| | 0,056 | Gerste | 57 |
| | 0,560 | Raps | 60 |
| 129 | 0,056 | Reis | 78 |
| | 0,056 | Gerste | 43 |
| | 0,560 | Sonnenblume | 100 |
| 130 | 0,056 | Reis | 100 |
| | 0,056 | Gerste | 43 |
| | 0,560 | Raps | 40 |
| | 0,560 | Sojabohnen | 33 |
| 131 | 0,056 | Gerste | 43 |
| | 0,560 | Sonnenblume | 100 |
| | 0,560 | Raps | 80 |
| | 0,560 | Sojabohnen | 47 |
| 132 | 0,056 | Reis | 78 |
| | 0,056 | Hafer | 50 |
| | 0,056 | Gerste | 57 |
| | 0,560 | Raps | 100 |
| | 0,560 | Korn | 58 |

409817/1173

Tabelle III (Fortsetzung)

Mehrere Getreide umfassende
Test- Ergebnisse, %-Schutz

| <u>Verbindung Nr.</u> | <u>Menge von EPTC, g/m²</u> | <u>Getreide</u> | <u>%-Schutz (2 Wochen)</u> |
|---------------------------|--|-----------------|--------------------------------|
| 133 | 0,056 | Gerste | 57 |
| | 0,056 | Hafer | 40 |
| | 0,560 | Zuckerrüben | 45 |
| | 0,560 | Raps | 100 |
| 134 | 0,056 | Gerste | 43 |
| | 0,560 | Sojabohnen | 33 |
| | 0,560 | Raps | 80 |
| 135 | 0,056 | Hafer | 60 |
| | 0,560 | Korn | 100 |
| | 0,560 | Raps | 100 |
| 136 | 0,056 | Reis | 55 |
| | 0,056 | Gerste | 57 |
| | 0,560 | Korn | 100 |
| | 0,560 | Raps | 80 |
| 137 | 0,056 | Gerste | 43 |
| | 0,560 | Sonnenblume | 70 |
| | 0,560 | Sojabohnen | 33 |
| 138 | 0,056 | Reis | 78 |
| | 0,056 | Gerste | 71 |
| | 0,560 | Raps | 60 |
| 139 | 0,560 | Sonnenblume | 70 |
| | 0,560 | Raps | 60 |
| 140 | 0,560 | Sonnenblume | 100 |
| | 0,560 | Raps | 60 |
| | 0,560 | Sojabohnen | 33 |
| 141 | 0,560 | Sojabohnen | 47 |
| | 0,560 | Raps | 60 |
| 142 | 0,056 | Reis | 86 |
| | 0,056 | Gerste | 62,5 |

Tabelle III (Fortsetzung)

Mehrere Getreide umfassende
Test-Ergebnisse, %-Schutz

| Verbindung Nr. | Menge von EPTC, g/m ² | Getreide | %-Schutz (2 Wochen) |
|-------------------|-------------------------------------|----------|------------------------|
| 143 | 0,056 | Reis | 100 |
| | 0,056 | Gerste | 87,5 |
| 144 | 0,056 | Sorghum | 100 |
| | 0,056 | Reis | 86 |
| | 0,056 | Gerste | 100 |
| | 0,560 | Korn | 100 |
| 145 | 0,056 | Reis | 100 |
| | 0,056 | Gerste | 100 |
| 146 | 0,056 | Gerste | 75 |
| | 0,560 | Raps | 100 |
| 147 | 0,056 | Reis | 72 |
| | 0,560 | Korn | 88 |

Bei Verwendung zusammen mit 2-Chlor-2',6'-diäthyl-N-(methoxymethyl)-acetanilid in Mengen von 0,224 g/m² zeigten die Verbindungen Nr. 1 und Nr. 30 in Mengen von 0,560 g/m² nach 4 Wochen 100%igen Schutz für Sorghum. Die Verbindung Nr. 1 ergab ebenfalls einen 67%igen Schutz für Weizen.

Bei Verwendung mit 3-(3,4-Dichlorphenyl)-1,1-dimethylharnstoff in Mengen von 0,112 g/m² ergaben die Verbindungen Nr. 1 und Nr. 30 in Mengen von 0,560 g/m² jeweils einen 60%igen Schutz für Baumwolle. Für Korn (corn) ergab Verbindung Nr. 1 ebenfalls einen 60%igen Schutz und Verbindung Nr. 30 einen 43%igen Schutz.


Die als Gegengift oder Gegenmittel wirkenden Verbindungen und Gemische der vorliegenden Erfindung können in jeder üblichen Form verwendet werden. So können die als Gegenmittel wirkenden Verbindungen in emulgierbaren Flüssigkeiten, emulgierbaren Konzentraten, Flüssigkeiten, netzbaren Pulvern, Pulvern, in granularer oder in jeder anderen üblichen Form formuliert werden. In der bevorzugten Form wird eine nicht phytotoxische Menge einer herbiziden Gegenmittel-Verbindung mit einem ausgewählten Herbizid vermischt und in die Erde⁺). Es ist jedoch verständlich, daß die Herbizide in die Erde eingearbeitet werden können und anschließend die als Gegenmittel wirkende Verbindung in die Erde eingearbeitet werden kann. Außerdem kann der Getreidesamen selbst mit einer nicht-phytotoxischen Menge der Verbindung behandelt werden und in die Erde, die mit den Herbiziden behandelt worden war oder die nicht mit den Herbiziden behandelt worden war und nachfolgend mit dem Herbizid behandelt wird, gebracht werden. Der Zusatz der als Gegenmittel wirkenden Verbindung beeinflußt nicht die herbizide Wirksamkeit der Herbizide.

Die Menge der vorhandenen als Gegenmittel wirkenden Verbindung kann zwischen etwa 0,001 bis etwa 30 Gewichtsteile der hierin beschriebenen als Gegenmittel wirkenden Verbindung pro Gewichtsteil des Herbizides betragen. Die genaue Menge der als Gegenmittel wirkenden Verbindung wird gewöhnlich durch ökonomische Verhältnisse für die übliche wirksamste Menge bestimmt. Es ist verständlich, daß eine nicht-phytotoxische Menge der als Gegenmittel wirkenden Verbindung in den hier beschriebenen herbiziden Gemischen verwendet wird.

⁺) vor oder nach dem Pflanzen der Samen eingearbeitet

P a t e n t a n s p r ü c h e:

1. Verbindung der allgemeinen Formel



worin X ein Sauerstoffatom oder ein Schwefelatom, R einen Halogenalkylrest, einen Alkylrest oder einen Alkylthioest, R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 und R_6 unabhängig von einander ein Wasserstoffatom, einen niederen Alkylrest, ein Alkoxyalkylrest oder einen niederen Alkylolrest bedeuten, wobei wenn X ein Sauerstoffatom, R_1 und R_2 Wasserstoffatome oder Methylreste und R_3 , R_4 , R_5 und R_6 jeweils ein Wasserstoffatom bedeuten, R keinen Dichlormethylrest bedeutet.

2. Verbindung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß X der Formel ein Sauerstoffatom, R einen Halogenalkylrest, R_1 einen niederen Alkylrest, R_2 einen niederen Alkylrest und R_3 , R_4 , R_5 und R_6 jeweils ein Wasserstoffatom bedeuten.

3. Verbindung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß R der Formel einen Dichlormethylrest, R_1 einen Methylrest und R_2 einen Äthylrest bedeuten.

4. Verbindung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß R der Formel einen Dichlormethylrest, R_1 einen Methylrest und R_2 einen t-Butylrest bedeuten.

5. Verbindung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß R der Formel einen Dichlormethylrest, R_1 einen Methylrest und R_2 einen i-Propylrest bedeuten.

6. Verbindung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß X der Formel ein Sauerstoffatom, R einen Alkylrest, R_1 einen niederen Alkylrest, R_2 niederen Alkylrest und R_3 , R_4 , R_5 und R_6 jeweils ein Wasserstoffatom bedeuten.

7. Verbindung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß X der Formel ein Schwefelatom, R einen Halogenalkylrest R_1 einen niederen Alkylrest, R_2 einen niederen Alkylrest und R_3 , R_4 , R_5 und R_6 jeweils ein Wasserstoffatom bedeuten.

8. Verbindung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß R der Formel einen Dichlormethylrest, R_1 einen Methylrest und R_2 einen Methylrest bedeuten.

9. Verbindung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß X der Formel ein Sauerstoffatom, R einen Halogenalkylrest, R_1 einen niederen Alkylrest, R_2 einen niederen Alkylrest, R_5 einen niederen Alkylrest und R_3 , R_4 und R_6 jeweils ein Wasserstoffatom bedeuten.

10. Verbindung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß R der Formel einen Dichlormethylrest, R_1 einen Methylrest, R_2 einen Methylrest und R_5 einen Methylrest bedeuten.

11. Verbindung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß X der Formel ein Sauerstoffatom, R einen Halogenalkylrest, R_1 einen niederen Alkylrest, R_2 einen niederen Alkylrest, R_3 einen niederen Alkylrest und R_4 , R_5 und R_6 jeweils ein Wasserstoffatom bedeuten.

12. Verbindung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß X der Formel ein Sauerstoffatom, R einen Halogenalkylrest, R_1 einen niederen Alkylrest, R_2 einen niederen Alkylrest, R_3 einen niederen Alkylrest und R_4 einen niederen Alkylrest und R_5 und R_6 jeweils ein Wasserstoffatom bedeuten.

13. Verbindung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß X der Formel ein Sauerstoffatom, R einen Halogenalkylrest, R_1 , R_2 , R_3 , R_4 und R_5 jeweils unabhängig voneinander einen niederen Alkylrest und R_6 ein Wasserstoffatom bedeuten.

14. Verbindung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß X der Formel ein Sauerstoffatom, R einen Halogenalkylrest, R_1 einen Alkoxyalkylrest und R_2 , R_3 , R_4 , R_5 und R_6 jeweils ein Wasserstoffatom bedeuten.

15. Verbindung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß R der Formel einen Dichlormethylrest und R_1 einen Methoxymethylrest bedeuten.


16. Verbindung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß X der Formel ein Sauerstoffatom, R einen Halogenalkylrest, R_1 einen niederen Alkylrest, R_5 einen niederen Alkylrest und R_2 , R_3 , R_4 und R_6 jeweils ein Wasserstoffatom bedeuten.


17. Verbindung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß X der Formel ein Sauerstoffatom, R einen Halogenalkylrest, R_3 einen niederen Alkylrest und R_1 , R_2 , R_4 , R_5 und R_6 jeweils ein Wasserstoffatom bedeuten.

18. Verbindung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß X der Formel ein Sauerstoffatom, R einen Dichlormethylrest, R_1 , R_2 und R_3 jeweils einen Methylrest, R_4 einen Methylolrest und R_5 und R_6 jeweils ein Wasserstoffatom bedeuten.

19. Verbindung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß X der Formel ein Schwefelatom, R einen Dichlormethylrest R_1 einen Äthylrest und R_2 , R_3 , R_4 , R_5 und R_6 jeweils ein Wasserstoffatom bedeuten.

Für: Stauffer Chemical Company


(Dr. H. J. Wolff)
Rechtsanwalt


409817/1173

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.